

Lineare Gleichungssysteme

Beispiel:

$$(I) \ 6x_1 + 2x_2 + 0x_3 = 22$$

$$(II) \ 4x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 33$$

$$(III) \ 0x_1 + x_2 + 4x_3 = 22$$

Lösung dieses linearen Gleichungssystems mit Hilfe des Gaußschen Algorithmus:

Koeffizientenmatrix:

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 0 \\ 4 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Erweiterte Koeffizientenmatrix:

$$(A/b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 6 & 2 & 0 & 22 \\ 4 & 3 & 3 & 33 \\ 0 & 1 & 4 & 22 \end{array} \right)$$

Ziel: Dreiecksform der Koeffizientenmatrix

$$\left(\begin{array}{ccc|c} * & * & * & * \\ 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & * & * \end{array} \right) \quad * \text{ sind reelle Zahlen}$$

1. Schritt: In der ersten Spalte muss statt 4 eine Null stehen

$$4 \cdot (I) - 6 \cdot (II): \quad 0 \quad -10 \quad -18 \quad | \quad -110$$

$$\begin{array}{l} (I) \\ (II) \\ (III) \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 6 & 2 & 0 & 22 \\ 0 & -10 & -18 & -110 \\ 0 & 1 & 4 & 22 \end{array} \right) \rightarrow \begin{array}{l} (I) \\ (II) \\ (III) \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 6 & 2 & 0 & 22 \\ 0 & 5 & 9 & 55 \\ 0 & 1 & 4 & 22 \end{array} \right)$$

2. Schritt: In der zweiten Spalte muss statt 1 eine Null stehen

$$5 \cdot (III) - (II): \quad 0 \quad 0 \quad 11 \quad | \quad 55$$

$$\begin{array}{l} (I) \\ (II) \\ (III) \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 6 & 2 & 0 & 22 \\ 0 & 5 & 9 & 55 \\ 0 & 0 & 11 & 55 \end{array} \right) \rightarrow \begin{array}{l} (I) \\ (II) \\ (III) \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 6 & 2 & 0 & 22 \\ 0 & 5 & 9 & 55 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{array} \right)$$

3. Schritt: Berechnen der Lösung des linearen Gleichungssystems

$$(III) \Rightarrow x_3 = 5$$

$$(II) \Rightarrow 5x_2 + 9x_3 = 55 \Rightarrow x_2 = 2$$

$$(I) \Rightarrow 6x_1 + 2x_2 = 22 \Rightarrow x_1 = 3$$

$\Rightarrow (3/2/5)$ ist Lösung des linearen Gleichungssystems (LGS)

Allgemeines lineares Gleichungssystem:

$$(I) a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$(II) a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$

(III)

(IV)

:

:

$$(m) a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m$$

m Gleichungen für n Unbekannte (m – n – System)

Es gilt:

(1) Ist $(b_1, b_2, \dots, b_m) = (0, 0, \dots, 0)$, so heißt das lineare Gleichungssystem homogen, sonst inhomogen.

(2) Ist $m > n$ ($m < n$), so heißt das lineare Gleichungssystem überbestimmt (unterbestimmt).

Aufgaben:

1)

$$(I) \quad 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 0$$

$$(II) \quad x_1 + x_2 + x_3 = -1$$

$$(III) \quad 5x_1 - x_2 + 2x_3 = 1$$

2)

$$(I) \quad x_1 - x_2 + 2x_3 = 1$$

$$(II) \quad 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 3$$

$$(III) \quad 4x_1 + x_2 + 3x_3 = 5$$

3)

$$(I) \quad x_1 - 2x_2 + x_3 = 1$$

$$(II) \quad -x_1 - 5x_2 - 5x_3 = 0$$

4)

$$(I) \quad x_1 - 7x_2 = 22$$

$$(II) \quad 3x_1 + 5x_2 = -12$$

$$(III) \quad 3x_1 + 6x_2 = 8$$

Lösungen:

1)

$$\begin{array}{c} \text{(I)} \\ \text{(II)} \\ \text{(III)} \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & -1 \\ 5 & -1 & 2 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} 2 \cdot (\text{II}) - (\text{I}) \\ 5 \cdot (\text{I}) - 2 \cdot (\text{III}) \end{array}} \begin{array}{c} \text{(I)} \\ \text{(II)} \\ \text{(III)} \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 17 & 1 & -2 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{17 \cdot (\text{III}) + (\text{II})} \begin{array}{c} \text{(I)} \\ \text{(II)} \\ \text{(III)} \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 18 & -36 \end{array} \right)$$

$$(\text{III}) \Rightarrow 18x_3 = -36 \Rightarrow x_3 = -2$$

$$(\text{II}) \Rightarrow -x_2 + x_3 = -2 \Rightarrow x_2 = 0$$

$$(\text{I}) \Rightarrow 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = 1$$

$\Rightarrow (1/0/-2)$ ist Lösung des linearen Gleichungssystems (LGS)

2)

$$\begin{array}{c} \text{(I)} \\ \text{(II)} \\ \text{(III)} \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} 2 \cdot (\text{I}) - (\text{II}) \\ 4 \cdot (\text{I}) - (\text{III}) \end{array}} \begin{array}{c} \text{(I)} \\ \text{(II)} \\ \text{(III)} \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & -5 & 5 & -1 \\ 0 & -5 & 5 & -1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{\text{II}) + (\text{III})} \begin{array}{c} \text{(I)} \\ \text{(II)} \\ \text{(III)} \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$(\text{III}) \Rightarrow 0x_3 = 0 \Rightarrow x_3 \text{ beliebig z.B. } x_3 = z$$

$$(\text{II}) \Rightarrow -5x_2 + 5x_3 = -1 \Rightarrow x_2 = \frac{1}{5} + z$$

$$(\text{I}) \Rightarrow x_1 - x_2 + 2x_3 = 1 \Rightarrow x_1 = \frac{6}{5} - z$$

$\Rightarrow (\frac{6}{5} - z / \frac{1}{5} + z / z)$ ist Lösung des linearen Gleichungssystems (LGS)

$$\Rightarrow \text{IL} = \left\{ \vec{x} / \vec{x} = \left(\begin{array}{c} \frac{6}{5} \\ \frac{1}{5} \\ 0 \end{array} \right) + z \left(\begin{array}{c} -1 \\ 1 \\ 0 \end{array} \right) \right\}$$

3)

$$\begin{array}{c} (\text{I}) \\ (\text{II}) \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 1 \\ -1 & -5 & -5 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{(I)} + \text{(II)}} \begin{array}{c} (\text{I}) \\ (\text{II}) \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & -7 & -4 & 1 \end{array} \right)$$

$$(\text{II}) \Rightarrow -7x_2 - 4x_3 = 1 \Rightarrow x_3 \text{ beliebig z.B. } x_3 = z \Rightarrow x_2 = -\frac{1}{7} - \frac{4}{7}z$$

$$(\text{I}) \Rightarrow x_1 - 2x_2 + x_3 = 1 \Rightarrow x_1 = \frac{5}{7} - \frac{15}{7}z$$

$\Rightarrow \left(-\frac{1}{7} - \frac{4}{7}z / \frac{5}{7} - \frac{15}{7}z / z \right)$ ist Lösung des LGS

4)

$$\begin{array}{c} (\text{I}) \\ (\text{II}) \\ (\text{III}) \end{array} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -7 & 22 \\ 3 & 5 & -12 \\ 3 & 6 & 8 \end{array} \right) \xrightarrow{3 \cdot (\text{I}) - (\text{III})} \begin{array}{c} (\text{I}) \\ (\text{II}) \\ (\text{III}) \end{array} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -7 & 22 \\ 3 & 5 & -12 \\ 0 & -27 & 58 \end{array} \right)$$

$$(\text{III}) \Rightarrow -27x_2 = 58 \Rightarrow x_2 = -\frac{58}{27}$$

$$(\text{II}) \Rightarrow 3x_1 + 5x_2 = -12 \Rightarrow x_1 = -\frac{34}{81}$$

$$\text{Überprüfen mit (I): } x_1 - 7x_2 = 22 \Rightarrow -\frac{34}{81} - 7 \cdot \left(-\frac{58}{27}\right) = 22 \Rightarrow \frac{1181}{81} = 22 \text{ (f)}$$

$$\Rightarrow \text{IL} = \emptyset$$